

PREPARAZIONE UREA BREATH TEST HELICOBACTER PYLORI

Per l'esecuzione del test è richiesto:

- Essere a digiuno dalla mezzanotte della sera prima
- Lavare accuratamente i denti prima dell'esame
- Avere sospeso terapia con antibiotici da almeno 1 mese
- Avere sospeso terapia con gastroprotettore da almeno 2 settimane (vedi elenco allegato)

ELENCO GASTROPROTETTORI DA EVITARE :

ANTEPSIN (Sucralfato)	PANTOPAN (Pantoprazolo)
ANTRA (Omeprazolo)	PANTORC (Pantoprazolo)
AXAGON (Esomeprazolo)	PARIET (Rabeprazolo)
BIOMAG (Cimetidina)	PEPTAZOL (Pantoprazolo)
BRUMETIDINA (Cimetidina)	PEPTIREX (Lansoprazolo)
BUSCOPAN ANTIACIDO (Ranitidina)	PERGASTRID (Lansoprazolo)
CRAFILM (Sucralfato)	RANIBEN (Ranitidina)
CRONIZAT (Nizatidina)	RANIBLOC (Ranitidina)
ERMES (Lansoprazolo)	RANIDIL (Ranitidina)
ESOPRAL (Esomeprazolo)	ROXIT (Roxatidina)
ETIDEME (Cimetidina)	SENSIGARD (Ranitidina)
EUGASTRAN (Lansoprazolo)	SUCRALFIN (Sucralfato)
FAMODIL (Famotidina)	SUCRAMAL (Sucralfato)
FRILANS (Lansoprazolo)	SUCRATE (Sucralfato)
GASTRALGIN (Roxatidina)	SUCRORIL (Sucralfato)
GASTROGEL (Sucralfato)	SURIL (Sucralfato)
LANSOX (Lansoprazolo)	TAGAMET (Cimetidina)
LEVOGENIX (Lansoprazolo)	TEMIC (Cimetidina)
LIMPIDEX (Lansoprazolo)	ULCEDIN (Cimetidina)
LOMEVEL (Lansoprazolo)	ULCEX (Ranitidina)
LOSEC (Omeprazolo)	ULCRAST (Sucralfato)
LUCEN (Esomeprazolo)	ULIS (Cimetidina)
MEPRAL (Omeprazolo)	ZANTAC (Ranitidina)
MOTIAX (Famotidina)	ZOTON (Lansoprazolo)
NEOH 2 (Roxatidina)	
NEXIUM (Esomeprazolo)	
NIZAX (Nizatidina)	
OMEPRAZEN (Omeprazolo)	
PANTECTA (Pantoprazolo)	
PANTOLOC (Pantoprazolo)	